

بررسی وضعیت آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر ۱۰ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان در سال ۱۳۹۲

مرضیه اسدی^{*}، دکتر ایرج صدیقی^{**}، دکتر محمد فلاح^{***}، دکتر مسعود سعیدی جم^{****}
دکتر امیرحسین مقصود^{*****}

دریافت: ۹۳/۶/۱۸ پذیرش: ۹۳/۲/۲۸

چکیده:

مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم‌ترین تکیاخته‌های پاتوژن روده‌ای، زئونوز و فرصت طلب می‌باشد و یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اسهال در افراد با نقص سیستم ایمنی و همچنین کودکان است. این مطالعه با در نظر گرفتن حساسیت بالای کودکان در برابر عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم، ماهیت زئونوز بودن آن، عدم وجود درمان قطعی علیه آن و همچنین عدم وجود مطالعه جدید در این زمینه در این منطقه و با هدف تعیین میزان شیوع این انگل در کودکان زیر ۱۰ سال مناطق شهری و روستایی شهرستان همدان صورت گرفت.

روش کار: مطالعه حاضر بر روی ۴۲۰ کودک (۲۲۲ نفر مذکور و ۱۹۸ نفر مونث) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفت. نمونه‌های مدفعه با روش تغليظ فرمالین-اتر و با روش رنگ‌آمیزی زیلنلسون اصلاح شده سرد مورد بررسی میکروسوکوپی قرار گرفتند. نتایج حاصل با آزمون آماری مرتب کاری مورد واکاوی قرار گرفتند.

نتایج: از کل کودکان مورد مطالعه ۲ نفر (۰/۴٪) (یک پسر ۱۶ ماهه و یک دختر شش ساله) مبتلا به عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم بودند، که هر دو ساکن روستا و در تماس مستقیم با دام بودند.

نتیجه نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه وجود این انگل را هرچند با شیوع کم، فقط در ساکنین مناطق روستایی و تنها در کودکان در تماس با دام نشان داد. بنابراین لزوم ارتقای سطح بهداشت و آگاهی‌های بهداشتی به خصوص در ساکنین مناطق روستایی احساس می‌شود.

کلید واژه‌ها: کریپتوسپوریدیوز- همه گیری شناسی / کریپتوسپوریدیوم / کودکان

سیستم ایمنی سالم ایجاد اسهال خودمحدود شونده و در افراد با نقص سیستم ایمنی ایجاد اسهال طولانی مدت کرده که ممکن است منجر به مرگ نیز شود (۳،۴). کریپتوسپوریدیوم دارای انتشار جهانی است و بیشترین شیوع این انگل در کودکان زیر ۱۰ سال مشاهده گردیده است. علایم بالینی کریپتوسپوریدیوز متنوع بوده و به طور کلی بستگی به وضعیت سیستم ایمنی میزبان دارد (۵).

مقدمه:

کریپتوسپوریدیوم از شاخه‌ی ابی کمپلکسا و یکی از مهم‌ترین تکیاخته‌های پاتوژن روده‌ای می‌باشد (۱). این تکیاخته یک انگل اجباری داخل سلولی است که در حاشیه‌ی میکروویلی‌های روده ساکن شده و نخستین بار در سال ۱۹۰۷ توسط ارنست ادوارد تیزر در غدد معدده‌ی موش آزمایشگاهی شناسایی شد (۲). این انگل در افراد با

* دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان

** دانشیار گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

*** استاد گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

**** دانشیار گروه پزشکی مولکولی و ژنتیک دانشکده دانشگاه علوم پزشکی همدان

***** استادیار گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (a.h.maghsood@umsha.ac.ir)

میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر ۱۰ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شهرستان همدان در سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ بود.

روش کار:

در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۴۲۰ کودک مورد بررسی قرار گرفتند. با روش خوشهای ۲ مرکز بهداشتی و درمانی شهری و ۷ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی انتخاب گردیده و نمونه گیری به صورت در دسترس انجام پذیرفت. کودکان وارد شده در این مطالعه، به دلایل مختلفی همچون بررسی وضعیت رشد و سلامت جسمانی، واکسیناسیون و یا ابتلا به بیماری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده بودند. پس از بیان اهداف مطالعه برای والدین کودکان و کسب رضایت آگاهانه از ایشان، پرسشنامه‌ای حاوی سوالاتی در مورد اطلاعات دموگرافیک و برخی اطلاعات دیگر از جمله محل سکونت، نوع آب آشامیدنی مصرفی، سابقه تماس نزدیک با دام، نحوه شستشوی سبزیجات خام، میزان تحصیلات مادر، سابقه مسافرت در دو هفته اخیر، عالیم بالینی و غیره برای هر کودک تکمیل و سپس نمونه مدفع آنان در ظروف استریل دریافت گردید. نمونه‌های دریافت شده برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه انگل‌شناسی دانشکده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان منتقل گردیدند.

ابتدا وضعیت فیزیکی و قوام نمونه‌های مدفع بررسی و ثبت گردید، سپس نمونه‌ها با روش فرمالین- اتر تغليظ و با روش زیل‌نلسون اصلاح شده رنگ‌آمیزی و به صورت میکروسکوپی مورد جستجو قرار گرفتند.

در روش فرمالین- اتر حدود نیم گرم از نمونه مدفع با هفت میلی‌لیتر فرمالین ده درصد در لوله سانتریفوژ مخلوط و صاف گردید، سپس سه میلی‌لیتر اتر اضافه نموده، خوب تکان داده شد و سه دقیقه در ۲۰۰۰ g سانتریفوژ گردید (۱۲). یک قطره از رسوب ته لوله روی لام قرار گرفته و با عدسی شیئی ۱۰ و ۴۰ میکروسکوپ نوری مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. برای رنگ‌آمیزی زیل‌نلسون اصلاح شده، گسترهای از رسوب ته لوله تهیه و پس از خشک شدن در مجاورت هوا، با متانول فیکس و رنگ کربول فوشین سرد به مدت زمان پانزده دقیقه روی لام‌ها اضافه گردید. شستشو با آب معمولی و رنگ‌بری با اسید الکل ۱ درصد (اسید کلریدریک- متانول، ۱ به ۹۹) به منظور بی‌رنگ شدن تقریبی لام از نظر رنگ

اسهال متداول ترین عالمت بالینی در مبتلایان است. علاوه بر اسهال، تب، کرامپ‌های شکمی، تهوع، استفراغ و کاهش وزن نیز از عالیم بالینی کریپتوسپوریدیوم محسوب می‌گردد (۶).

کریپتوسپوریدیوم تک‌یاخته‌ای زئونوز و فرصت طلب بوده و راه اصلی انتقال آن مدفعی- دهانی است. اغلب عفونت انسان، ناشی از تماس با حیوانات آلوده به این انگل می‌باشد. یکی از مهم‌ترین حیوانات انتقال دهنده، گوساله آلوده به این انگل می‌باشد که قادر است اووسیسته‌های کریپتوسپوریدیوم را به انسان منتقل سازد (۷-۹). علاوه بر این روش انتقال، کریپتوسپوریدیوم قادر است از طریق تماس شخص به شخص و آب یا غذای آلوده نیز منتقل گردد. گونه‌های مختلفی از کریپتوسپوریدیوم قادرند در انسان و دیگر مهره‌داران ایجاد عفونت کنند (۱۰، ۱۱).

اووسیست کریپتوسپوریدیوم به صورت اسپروله دفع می‌گردد، بنابراین بلافصله پس از دفع، قابلیت آلوده کردن را دارد و همچنین در برابر داروهای ضد انگلی، شرایط نامساعد محیطی و ترکیبات ضد عفونی کننده‌ی متداول مقاوم می‌باشد (۱۲-۱۷). اووسیسته‌های این انگل به قطر ۴-۶ میکرومتر بوده و در زیر میکروسکوپ با مخرمهای موجود در مدفع اشتباه می‌شوند. از این رو برای تشخیص کریپتوسپوریدیوم روش‌های متنوعی همچون رنگ‌آمیزی زیل‌نلسون اصلاح شده، رنگ‌آمیزی فلوئورسانس، روش‌های ایمونوآسی، روش‌های هیستوپاتولوژی، فلوسیتومتری و روش‌های مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین جداسازی اووسیست کریپتوسپوریدیوم از نمونه‌ی مدفع با روش‌های تغليظ (رسوی یا فلوتاسیون) مانند فرمالین اتر و محلول قندی شیتر صورت می‌گیرد (۱۰، ۱۸).

با توجه به عدم رعایت کامل بهداشت توسط کودکان، وجود مصونیت کمتر در آن‌ها، همچنین ماهیت زئونوز بودن کریپتوسپوریدیوز و نبود درمان قطعی علیه آن، آلودگی به این انگل در کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۱۹). از طرف دیگر تعیین وفور انگل کریپتوسپوریدیوم می‌تواند اطلاعات اپیدمیولوژیک مفیدی جهت اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی در خصوص کنترل و پیشگیری بیماری در منطقه فراهم نماید و با توجه به عدم وجود پژوهشی جدید در این زمینه و در کودکان شهرستان همدان، ضرورت اجرای این مطالعه احساس گردید. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین

آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان شهری دیده نشد اما در ۵۶٪ کودکان تحت مطالعه ساکن روستا (۲ مورد از ۳۵۲ مورد) مشاهده گردید. نکته قابل توجه اینکه هر دو فرد آلوده، در تماس نزدیک با دام بودند و هر دو مورد نیز در فصل تابستان تشخیص داده شدند.

این تک یاخته در جنس پسر ۴۵٪ (۱۱ مورد از ۲۲۲ مورد) و در جنس دختر ۵٪ (۱ مورد از ۱۹۸ مورد) مشاهده شد. میزان آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گروه سنی کمتر از ۲ سال ۹۱٪ (۱۰۹ مورد) و گروه سنی ۶ تا ۸ سال ۳۳٪ (۱۱ مورد از ۷۵ مورد) مشاهده شد و در دیگر گروههای سنی (۲ تا ۴ سال، ۴ تا ۶ سال و ۶ تا ۸ سال) آلودگی مشاهده نشد.

در مطالعه حاضر میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مربوط به کودکانی بود که مادر آن‌ها دارای تحصیلات ابتدایی (۵۸٪/۰) مورد از ۱۷۰ مورد) و دبیرستان (۹۹٪/۰) مورد از ۱۰۱ مورد) بودند. در ضمن موارد مثبت آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مربوط به کودکانی بود که نحوه شستشوی سبزیجات در خانواده آن‌ها توسط آب به همراه مایع ظرفشویی (۴۳٪/۰) مورد از ۲۲۸ مورد) و مواد ضد عفونی کننده (۵۶٪/۰) مورد از ۶۴ مورد) انجام می‌گرفت. بین میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و متغیرهای سن، محل سکونت، تماس مستقیم با حیوان، میزان تحصیلات مادر، نحوه شستشوی سبزیجات و همچنین در مورد سایر متغیرها یعنی جنس، نوع آب آشامیدنی خانوار و تغذیه کودک شیرخوار با شیر مادر نیز از نظر آماری ارتباط معنی داری مشاهده نگردید ($P>0.05$) که احتمالاً به علت میزان شیوع اندک آلودگی به کریپتوسپوریدیوم می‌باشد.

بحث:

مطالعه حاضر شیوع اندک این انگل را تنها در کودکان مناطق روستایی شهرستان همدان نشان داد. با توجه به نقش کریپتوسپوریدیوم به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده اسهال‌های طولانی مدت و خطرناک، به ویژه در افراد با نقص ایمنی و نیز کودکان دارای سوء‌تغذیه و این‌که هنوز هیچ درمان دارویی قاطعی جهت کریپتوسپوریدیوز معرفی نشده است و با توجه به عدم رعایت کامل بهداشت توسط کودکان و همچنین وجود مصنونیت کمتر در آن‌ها، آلودگی به این انگل در کودکان زیر ۱۰ سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


کربول فوشین، در ادامه شستشوی مجدد لام و افزودن رنگ متیلن بلو ۰/۴ درصد به مدت ۳۰ ثانیه و در نهایت شستشوی نهایی لام‌ها انجام شد و در دمای آزمایشگاه در مجاورت هوا خشک گردیدند (۱). لام‌ها از نظر وجود تک یاخته‌ی کریپتوسپوریدیوم با روغن ایمرسیون و با عدسی شیئی ۱۰۰ میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.

داده‌های بدست آمده از آزمایشات انگل‌شناسی و عوامل خطر مختلف پس از کدبندی و ثبت در کامپیوتر، با نرم افزار SPSS (نگارش ۲۰) و آزمون آماری مربع کای موردنداوی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری $P<0.05$ در نظر گرفته شد.

نتایج:

بیشترین مراجعات مربوط به مناطق روستایی ۳۵۲ نفر (۸۳٪/۰) و بقیه مربوط به مناطق شهری ۶۸ نفر (۱۶٪/۰) بود. ۲۲۲ نفر (۸۵٪/۰) مذکر و ۱۹۸ نفر (۱۴٪/۰) مونث بودند. در این مطالعه کمترین سن ۲ ماه و بیش‌ترین سن ۱۰ سال و همچنین میانگین سن افراد ۵ سال بود.

در مجموع تک یاخته‌ی کریپتوسپوریدیوم به کمک رنگ آمیزی زیل‌نلسون اصلاح شده در ۲ نمونه (۴۷٪/۰) از ۴۰ نمونه مدفعه تشخیص داده شد (شکل ۱). مورفولوژی نمونه‌های مثبت تشخیص داده با استفاده از کنترل مثبت بررسی و تایید گردید.



شکل ۱: اووسیست کریپتوسپوریدیوم در رنگ آمیزی زیل‌نلسون اصلاح شده

این انگل گزارش گردیده است (۱) و با توجه به مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۹ با هدف بررسی آب تصفیه شده و آب خام شهر همدان از لحاظ آلودگی به اووسیست کریپتوسپوریدیوم صورت گرفته، میزان اووسیست‌های مشاهده شده در آب تصفیه شده و آب خام این شهر به ترتیب ۰/۲۵ و ۱/۵ عدد در هر ۱۰۰ لیتر آب بوده است، که این میزان بالاتر از حد استاندارد آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در مخزن اصلی آب شهر می‌باشد (۲۷). بنابراین این موضوع اهمیت تامین آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضلاب را در این شهرستان مطرح می‌سازد. در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۴ بر روی ۵۵۴ نمونه مذکور از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال در شهرستان همدان انجام گرفت، ۳۰ نفر (۰/۵/۴۰) از کودکان مبتلا به اسهال، آلوده به کریپتوسپوریدیوم بودند که میزان آلودگی در گروه سنی ۴-۱ سال مشاهده شده است (۲۸) اما در مطالعه‌ی جدیدی که در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۲۸ نفر از افراد در تماس با دام در شهرستان همدان صورت گرفت، فراوانی کریپتوسپوریدیوم ۲ مورد (۰/۰/۷۸) گزارش شده است که با نتایج حاصل از مطالعه‌ی حاضر هم‌خوانی دارد (۱۸). باز هم در مطالعه‌ای دیگر که در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۸۰ نفر از بیماران پیوندی در شهرستان همدان صورت گرفت، فراوانی کریپتوسپوریدیوم ۱ مورد (۰/۰/۵۵) گزارش شده است که با نتایج حاصل از مطالعه‌ی حاضر هم‌خوانی دارد (۲۹). بنابراین میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در شهرستان همدان بر اساس تحقیقات انجام شده طی سال‌های گذشته، سیر نزولی بسیار خوبی را نشان می‌دهد، که به طور کلی می‌تواند به دلیل ارتقای سطح بهداشت و آگاهی‌های بهداشتی مردم حتی در ساکنین مناطق روستایی باشد.

در مطالعه‌ای که طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ بر روی ۳۰۰ بیمار ارجاعی به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان همدان صورت گرفت، ۱۶ مورد (۰/۵/۳۳) کریپتوسپوریدیوم تشخیص داده شد که بالاتر از مطالعه‌های ذکر شده در همدان بود (۲۶). با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته‌ی اخیر و هم‌خوانی نتایج آن‌ها با تحقیق حاضر، نتایج حاصل از مطالعه‌ی نامبرده بسیار تامل برانگیز می‌باشد، که محتمل بر وجود ارگانیسم‌های اسید فست دیگر مشابه با کریپتوسپوریدیوم

کریپتوسپوریدیوم انگلی با انتشار جهانی است. در ایران مانند دیگر کشورها، مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص انتشار این انگل انجام شده است. تحقیقات انجام شده در سالهای قبل نشان دهنده‌ی طیف گسترده‌ای از عفونت ۰٪ تا ۳۲٪ در جوامع مختلف بوده است (۲۰، ۲۱). نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان منطقه مورد مطالعه (۰/۰/۴۷) می‌باشد که مشابه با نتیجه حاصل از مطالعه قبلی همدان (۰/۰/۷۸) (۱۸)، کمتر از نتایج بدست آمده از مطالعات اصفهان (۰/۰/۴۰) و تهران (۰/۰/۲۲، ۰/۰/۲۳) و بیشتر از مطالعات انجام شده در بابل- بابلسر (۰/۰/۱۲) و مازندران (۰/۰/۰) می‌باشد (۲۴، ۲۵).

در این مطالعه میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم تنها در ساکنین مناطق روستایی دیده شده است که می‌تواند به دلیل پایین بودن سطح آگاهی‌های بهداشتی مردم، نبود منابع آب آشامیدنی سالم در برخی از روستاهای افزایش تماس با خاک و حیوانات در کودکان روستایی در مقایسه با ساکنین مناطق شهری باشد.

در این مطالعه هر دو فرد مبتلا به کریپتوسپوریدیوز تماس مستقیم با دام داشته‌اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد شیوع این انگل در دام‌های شهرستان همدان طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که به ترتیب میزان شیوع کریپتوسپوریدیوز را در دام‌ها ۰/۱۵/۹۳ و ۰/۱۲/۸۰ گزارش نمودند (۱۸، ۲۶) و با توجه به نتیجه‌ی مطالعه‌ی حاضر، تماس مستقیم با دام‌های آلوده به این انگل، نقش بسیار با اهمیتی در شیوع عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم در این منطقه دارد. از طرفی استفاده از کود این حیوانات برای مصارف کشاورزی، به خصوص در مزارع سبزیجات و همچنین احتمال آلوده نمودن منابع آب‌های آشامیدنی توسط آنان، می‌تواند نقش بسیار زیادی در انتقال این انگل داشته باشد.

در این مطالعه موارد مثبت آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مربوط به کودکانی بود که نوع آب مصرفی آن‌ها آب لوله‌کشی روستایی (۱ مورد) و آب چاه (۱ مورد) بوده است که می‌تواند به علت عدم تامین آب آشامیدنی سالم، فقدان سیستم بهداشتی دفع فاضلاب و کمبود تسهیلات بهداشتی در مناطق روستایی باشد.

با توجه به این که تا حال چندین اپیدمی عفونت کریپتوسپوریدیوز به علت مصرف آب آشامیدنی آلوده به

منابع:

1. Fayer R. Cryptosporidium and cryptosporidiosis. New York: CRC Press, 2007:1-7, 79-82,174-87.
2. Huang DB, Chappell C, Okhuysen PC. Cryptosporidiosis in children. Semin Pediatr Infect Dis 2004; 15(4): 253-9.
3. Deng M, Rutherford MS, Abrahamsen MS. Host intestinal epithelial response to cryptosporidium parvum. Adv Drug Deliv Rev 2004; 56(6): 869-84.
4. EI Mansoury ST, Abou EI Naga IF, Negm AY, Amer EE. Influence of temperature and salinity on the viability and infectivity of giardia lamblia and cryptosporidium parvum. J Egypt Soc Parasitol 2004; 34(1): 161-72.
5. Larry K, Pickering and Thomas G, Cleary. Gastrointestinal infections. Text book of pediatric infectious disease. 3rd ed. Houston: Elsevier, 1992: 565-96.
6. Cicirello HG, Kehl KS, Addiss DG, Chusid MJ, Glass RI, Davis JP, et al. Cryptosporidiosis in children during a massive waterborne outbreak in Milwaukee, Wisconsin: clinical, laboratory and epidemiologic findings. Epidemiol Infect 1997; 119(1): 53-60.
7. Joachim A. Is cryptosporidium a zoonotic agent? Wien Klin Wochenschr 2004; 116 (Suppl 14): 2-6.
8. Chermit KD, Bofaso M. [Cryptosporidiosis is a world wide disease in animals and human]: Translated by Baghbanzadeh Rasouli. Islamic Committee of Veterinary Science Faculty. Tehran University of Medical Sciences, 2000: 54-83.(Persian)
9. Sharol R. Risk factors for sporadic cryptosporidiosis among imm persons in the United States. Clin Infect Dis 2005; 25 (4): 32-41.
10. Goh S, Reacher M, Casemore DP, Verlander NQ, Chalmers R, Knowles M. Sporadic cryptosporidiosis, North Cumbria, England 1996-2000. Emerg Infect Dis 2004; 10(6): 1007-15.
11. Brown NF. Basic clinical parasitology. 6th ed. Norwalk CT: Appleton & Lang, 2000: 232-4.
12. Sterling CR. Cryptosporidium parvum: A decade of effort. an overview of the Cleveland workshop. J Eur Microbiol 1994; 41(5): 68.
13. Flanigan TP, Soare R. Cryptosporidiosis. Prog Clin Parasitol 1993; 3: 1-20.
14. Ritchie DJ, Becker ES. Update on the management of intestinal cryptosporidiosis in AIDS. Ann Pharmacother 1994; 28(6): 767-78.
15. Fayer R. Effect of high temperature on infectivity of cryptosporidium parvum oocysts in water. Appl Environ Microbial 1994; 60(8): 2732-5.
16. Robertson LJ, Campbell AT, Smith HV. Survival of cryptosporidium parvum oocysts under various environmental pressure. Appl Environ Microbiol 1992; 58(11): 3494-500.
17. Jafari R, Maghsoud AH, Fallah M. Prevalence of cryptosporidium infection among livestock

می باشد که می توانند در امر تشخیص این انگل مداخله نمایند.

در مطالعه حاضر از نظر تظاهرات بالینی همچون تب، آلدوده به کریپتوسپوریدیوم علایم بالینی همچون تب، سرددرد، کاهش وزن، درد شکم، کاهش اشتها و نفخ را نشان دادند. همچنین بررسی وضعیت فیزیکی و قوام مدفوع دو کودک مبتلا در این مطالعه، نشان دهندهی حالت شل تا آبکی بودن نمونه ها در هر دو فرد بود. در حال حاضر روش های تشخیصی دیگری از جمله رنگ-آمیزی انگل با روش های فلورسانس، رنگآمیزی ایمuno PCR فلورسانس با آنتی بادی مونو یا پلی کلونال، الیزا و در دسترس است. در این مطالعه از روش رنگآمیزی زیل-نلسون استفاده شد. می توان پیش بینی کرد در صورت استفاده هم زمان از روش های حساس تری همچون روش های مولکولی و ایمونولوژیک نتایج بهتری به دست می آمد، لذا پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی از روش های حساس تر نیز به طور هم زمان استفاده شود.

نتیجه نهایی:

در این مطالعه موارد آلدگی به کریپتوسپوریدیوم تنها در کودکان ساکنین روستا دیده شد. از آنجایی که هر دو فرد آلدوده به کریپتوسپوریدیوم در این مطالعه دارای تماس مستقیم با دام بودند و با توجه به شیوع این انگل در دامها، بنابراین رعایت کامل بهداشت به خصوص در کودکان و تماس هر چه کمتر آنان با دام و همچنین دقت در استفاده از کود دامی در مزارع، به خصوص در مزارع سبزیجات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سپاسگزاری:

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده و با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری آن دانشگاه صورت گرفته است. نویسندها بر خود لازم می دانند از کلیه پرسنل و مسؤولین مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان، همچنین از سرکار خانم سکینه کریم خانی تکنسین محترم آزمایشگاه انگل شناسی، که با زحمات بی دریغ خود، انجام آزمایش ها را هماهنگ و تسهیل نمودند و والدین کودکانی که ما را در انجام این طرح باری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نمایند.

- and humans in contact with livestock in Hamadan District, Iran, 2012. *J Res Health Sci* 2012; 13(1): 86-9.
19. Legesse M, Erko B. Prevalence of intestinal parasites among school children in a rural area close to the South east of Lake Langano, Ethiopia. *Ethiop J Health Dev* 2004; 18(2): 116-20.
 20. Nahrevanian H, Azarinoosh A, Esfandiari B, Amirkhani A, Ziapoor S, Shadifar M. The frequency of cryptosporidiosis among gastroenteritic patients in western cities of Mazandaran Province (2007-2009). *J Qazvin Univ Med Sci* 2011; 15(1): 78-86. (Persian)
 21. Sazmand A, Rasooli A, Nouri M, Hamidinejat H, Hekmatimoghaddam S. Prevalence of Cryptosporidium spp. in camels and involved people in Yazd Province, Iran. *Iranian J Parasitol* 2012; 7(1): 80-4.
 22. Azami M, Dorostkar Moghadam D. [Prevalence of cryptosporidium in children under 5 years of age, immunocompromised patients and high risk persons in Isfahan Province]. *Iranian South Med J* 2008; 11(1): 47-54. (Persian)
 23. Taghipour N, Nazemalhosseini-Mojarad E, Haghghi A, Rostami-Nejad M, Romani S, Keshavarz A, et al. Molecular epidemiology of cryptosporidiosis in Iranian children, Tehran, Iran. *Iran J Parasitol* 2011; 6(4): 41-5.
 24. Ghorbannia Delavar A, Nahrevanian H, Asmar M, Amirkhani A, Esfandiari B. [Prevalence of cryptosporidiosis, parasites and other pathogens in patients with gastroenteritis (Babol and Babolsar,2005-6)]. *J Babol Univ Med Sci* 2008; 10(2): 56-61. (Persian)
 25. Kia E, Hosseini M, Nilforoushan M, Meamar A, Rezaeian M. Study of intestinal protozoan parasites in rural inhabitants of Mazandaran Province, Northern Iran. *Iranian J Parasitol*. 2008; 3(1): 21-5.
 26. Heidari H, Gharah khani J. [Frequency of infection of humans, animals and birds found in the City of Hamadan 2006 - during 2012 Suburban]. *Sci J Hamdan Univ Med Sci* 2012; 19(3). (Persian)
 27. Fallah M, Bastami Nejad S, Maghsoud AH, Rahmani AR, Kakaei H, Akbari A. [Detection of giardia cysts and cryptosporidium oocysts in drinking water resources in Hamadan city]. *J Ilam Univ Med Sci* 2013; 21(5): 29-33. (Persian)
 28. Fallah M, Haghghi A. Cryptosporidiosis in children with diarrhea admitted to health centers in the west of Iran (Hamadan). *Med J Islam Repub Iran*. 1996; 9(4): 315-7.
 29. Jafari R, Gharibi Z, Fallah M. The prevalence of cryptosporidium infection among renal transplanted patients in Hamadan city, west of Iran. *Avecinna J Clin Microbiol Infect* 2014; 1(1): 28-30.

Original Article

A Survey Study of Cryptosporidium Infection in Children under 10 Years Old Referred to the Health Care Centers of Hamadan District in 2013

M. Asadi, M.Sc. ^{*}; I. Sedighi, M.D. ^{**}; M. Fallah, Ph.D. ^{***}; M. Saidijam, Ph.D. ^{****}
A.H. Maghsoud, Ph.D. ^{*****}

Received: 18.5.2014 Accepted: 9.9.2014

Abstract

Introduction & Objective: Cryptosporidium is one of the most important zoonotic and opportunistic protozoa and can cause diarrhea in those with impaired immune systems, as well as the children. Considering the high sensitivity of children against infection caused by cryptosporidium, its zoonotic nature and lack of treatment, this study aimed to determine the prevalence of cryptosporidium infection in children under 10 years old, referred to the health care centers of Hamadan district.

Materials & Methods: This study was conducted in 2013 on 420 children (222 males and 198 females), who were referred to urban and rural health care centers in Hamadan district. Stool samples were examined using formalin-ether method and modified Ziehl-Neelsen staining technique. The results were analyzed with chi-square test.

Results: Of the 420 children studied, 2 individuals (0.47%) (A 16-month-old boy and a 6-year-old girl) were infected with cryptosporidium spp. The infection was observed only in rural areas and in children that were in direct contact with the animals.

Conclusion: The results of this study showed a presence of cryptosporidium in rural areas compared to urban areas and in children in contact with animals. Therefore it is necessary to promote the public health awareness of rural population.

(*Sci J Hamadan Univ Med Sci* 2014; 21 (3): 211-217)

Keywords: Children / Cryptosporidiosis-epidemiology / Cryptosporidium

* M.Sc. student of Parasitology , Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.

** Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine

Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.

*** Professor, Department of Parasitology, School of Medicine

Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.

**** Associate Professor, Department of Molecular Medicine & Genetic, School of Medicine

Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.

***** Assistant Professor, Department of Parasitology, School of Medicine

Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.(a.h.maghsoud@umsha.ac.ir)