

مقاله پژوهشی

بررسی پلی مورفیسم CCL2 در مبتلایان به بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا از منطقه‌ی شمال غرب ایران

طاهره محمدیان^{*}, دکتر مرتضی بنیادی^{**}, دکتر علیرضا جوادزاده^{***}, دکتر محمدحسین جبارپور بنیادی^{****}

دریافت: ۹۴/۲/۲۱ پذیرش: ۹۳/۱۰/۸

چکیده:

مقدمه و هدف: دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (AMD) بیماری است که نواحی مرکزی رتینا و کروئید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و میتواند منجر به از دست رفتن بینایی شود. مطالعات در زمینه اتیولوژی این بیماری پیشنهاد می‌کند که AMD یک بیماری پیچیده می‌باشد که در اثر واکنش‌های چندین ژن و عوامل محیطی ایجاد می‌شود. مطالعات بسیاری بر روی نقش سایتوکاین‌های کموتاکسیک که کموکاین‌هم نامیده می‌شود تمرکز کرده است. کموکاین‌های خاصی مثل CCL2 به نظر میرسد که در ایجاد دژنراسیون رتینا و رگ زایی کروئیدی مهم باشند. به منظور تعیین ارتباط بین واریانت‌های ژن CCL2 با بیماری AMD به مطالعه‌ی پلی مورفیسم CCL2-۲۵۱۸T در این ژن پرداخته شد.

روش کار: در این مطالعه‌ی مورد-شاهدی ارتباط پلی مورفیسم CCL2-۲۵۱۸T در منطقه پرموموتری ژن CCL2 در ۶۰ بیمار مبتلا به AMD و ۵۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل که از نظر جنس، سن و قومیت با گروه بیمار تطابق داشتند مورد بررسی قرار گرفت. هر دو گروه بیمار و کنترل از منطقه‌ی شمال غرب ایران بودند. ژنتیک آنها با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و چندشکلی طول قطعات هضم شونده تعیین شد.

نتایج: آنالیزهای آماری فرکانس بالای ژنتیک TT و آلل T در بیماران دژنراسیون وابسته به سن ماکولا را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد اگرچه تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه نهایی: علی رغم تفاوت اندکی که بین گروه شاهد و کنترل بود آنالیزهای آماری در ژن CCL2 هیچ گونه ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم CCL2-۲۵۱۸T و بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا نشان نداد.

کلید واژه‌ها: استحاله ماکولا / پلی مورفیسم / ژن CCL2

می‌تواند شدیداً باعث تضعیف دید مرکزی بیمار و نهایتاً کوری گردد (۱).

فاکتورهایی که می‌تواند در ایجاد بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا نقش داشته باشند عبارتند از: سن، نژاد، رژیم غذایی، مصرف دخانیات و چاقی. از آنجاییکه نقش دخالت شماری از ژن‌ها در استعداد ابتلا به این بیماری در افراد مشاهده شده است این بیماری یک بیماری پلی ژنیک محسوب می‌شود (۲).

بنظر میرسد که التهاب در بیماری زایی بیماری AMD

مقدمه:

دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (Age-related Macular Degeneration; AMD) یکی از علل اختلال بینایی در دوران پیری می‌باشد. مراحل اولیه بیماری با تشکیل رسوب‌هایی در زیر شبکیه به نام دروزن همراه است که به مرور آتروفی یا خشکی شدید در ناحیه ماکولا ایجاد می‌شود و همزمان با پیشرفت بیماری رگ زایی، ایجاد زخم و خونریزی در ناحیه زیر شبکیه اتفاق می‌افتد. در صورتیکه AMD به مرحله پیشرفته و رگ زایی برسد

* کارشناسی ارشد ژنتیک، قطب علمی تنوع زیستی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز


** دانشیار ژنتیک پزشکی، قطب علمی تنوع زیستی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز (jabbarpour@tabrizu.ac.ir)

*** استاد گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

**** چشم پزشک، مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرم رضایت، خونگیری شد.

DNA ژنومی از خون افراد با استفاده از پروتکل استاندارد استخراج DNA (نمک اشباع) استخراج گردید (۱۰). استخراج شده با استفاده از روش PCR (دستگاه ترموسایکل 22500 ABI) تکثیر و با استفاده از روش RFLP-PCR ژنتوتیپ افراد در جایگاه ۲۵۱۸-۲۹۳ تعیین گردید. پرایمرهای مورد استفاده شامل پرایمر پیشرو ۳' G GGAACCTCCA AAGCTGCCT ۵' و پرایمر پیرو ۳' AG CTTGCTGGC TGAGTGTT ۵' می‌باشد که پس از طراحی از شرکت ژن فن آوران سفارش و خریداری گردید. آنزیم محدودگر PvuII (شرکت فرمنتاز، کشور آلمان) برای هضم آنزیمی استفاده گردید که همراه با بافر مخصوص آنزیم و محصولات PCR به مدت یک شبانه روز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در بنماری نگهداری شدند. محصولات هضم آنزیمی شده PCR بر روی ژل آگارز ۱/۵ درصد الکترو فورز شده و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید در نور UV مشاهده شدند. آنزیم PvuII زمانی که آلل C در این جایگاه وجود دارد برش را انجام می‌دهد و دو قطعه‌ی ۱۲۱ بازی و ۱۷۲ بازی را تولید می‌کند. بنابراین، در نمونه‌های با ژنتوتیپ CC دو باند و در ژنتوتیپ TC سه باند ۲۹۳، ۱۲۱ و ۱۷۲ بازی مشاهده شد (شکل ۱).



شکل ۱: محصولات RFLP-PCR پلی مورفیسم C-۲۵۱۸ T

CCL2

۱: مارکر ۲: ژنتوتیپ CT (دو باند ۱۷۲ و ۱۲۱ باندی که نشاندهنده‌ی هضم یکی از رشته‌ها توسط آنزیم PvuII می‌باشد و باند ۲۹۳ بازی هضم نشده در رشته‌ی دیگر) ۳: ژنتوتیپ CC (آنژیم هر دو رشته را در جایگاه آلل C برش داده است) ۴: ژنتوتیپ TT (هیچیکی از رشته‌ها دچار هضم آنزیمی نشده است)

نقش مهمی داشته و مطالعات مختلف در سالهای اخیر موبید نقش التهاب در بروز و پیشرفت این بیماری است. تشکیل دروزن‌ها در این بیماری که حاوی اجزای مربوط به سیستم ایمنی و التهابی بوده و همچنین مشاهده سلول‌های التهابی مزمن در سطح خارجی غشای برونژ در مواردی که رگ زایی اتفاق می‌افتد تاثیر التهاب در این بیماری را تایید می‌کنند (۳-۶). بر همین اساس ژن‌های مربوط به سیستم ایمنی و التهابی در رابطه با بیماری AMD بسیار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که از جمله‌ی آنها ژن CFH (کد کننده‌ی فاکتور کمپلمان H) FB C2 را میتوان نام برد (۷).

کموکاین‌ها از جمله مولکول‌هایی هستند که نقش آنها در بروز التهاب در بیماری‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. کموکاین‌ها عضوی از خانواده سایتوکاین‌ها می‌باشند که نقش‌های مهمی در رشد و نمو جنین، ایجاد و بقای ایمنی ذاتی و اکتسابی دارند. به علاوه این مولکول‌ها نقش مهمی را در التیام زخم و آنژیوژن، التهاب‌های مزمن، تومور زایی، متاستاز و بیماری‌های مربوط به سیستم ایمنی بر عهده دارند (۸).

CCL2 عضوی از خانواده‌ی کموکاین‌های CC همراه با رسپتور خود CCR2 رگ زایی را در سلول‌های اندوتیال میانجیگری می‌کند. مطالعات نشان داده است که پلی مورفیسم C/T در جایگاه پروموتی ۲۵۱۸-۲۹۳ (NC_000017) CCL2 تحت تاثیر قرار دهد (۹).

هدف این مطالعه مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن مذکور در دو گروه بیمار و شاهد و بررسی همراهی احتمالی پلی مورفیسم پروموتی ۲۵۱۸-۲۹۳ C/T ژن CCL2 بر استعداد ابتلا به بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولادر منطقه‌ی شمال غرب ایران می‌باشد.

روش کار:

در این مطالعه مورد شاهدی ۱۱۰ نفر مورد بررسی ژنتیکی در جایگاه پلی مورفیسم C-۲۵۱۸ در ژن CCL2 قرار گرفتند. از این تعداد ۶۰ نفر مبتلا به بیماری AMD بودند که توسط متخصص چشم پزشکی به مرکز ژنتیک معرفی شده بودند. گروه کنترل را ۵۰ نفر بزرگسال بدون سابقه یا ابتلا به بیماری‌های التهابی، ایمنولوژیکی تشکیل می‌دادند. هر دو گروه کنترل و بیمار از جمعیت شمال غرب ایران بودند. از هر دو گروه بیمار و کنترل پس از تکمیل

ژنوتیپ TC در گروه بیمار ۳۳/۳۳ درصد میباشد در حالیکه این مقدار در گروه کنترل ۲۲ درصد است و میزان P محاسبه شده برای این ژنوتیپ ۰/۰۶۷ میباشد که معنی دار نیست. مقدار فرکانس ژنوتیپ CC در گروه کنترل و دار نیست. بیمار تقریباً یکسانی به دست آمد (۱۱/۶۶) درصد در گروه بیمار تقریباً یکسانی به دست آمد (۱۲) درصد در گروه بیمار و ۱۲ درصد در گروه کنترل) که مقدار معنی داری از نظر آماری نشان نمی دهد. نتایج حاصل از بررسی های آللی میزان بالای آلل T را در گروه بیمار نشان داد (۸۶ درصد در مقایسه با ۶۶ درصد) که این مقدار نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود ($P=0/۲۳۸$) نتایج به دست آمده از آنالیزهای آماری در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱: توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم C-۲۵۱۸T بین گروه کنترل و بیمار


آرژن P	شانس	کنترل		بیمار (n=۶۰)		ژنوتیپ
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۰/۰۷۹	۱/۵۵۶	۴۴	۲۲	۸۵	۳۳	TT
۰/۰۶۷	۰/۶۳۶	۴۴	۲۲	۳۳/۳۳	۲۰	TC
۰/۴	۰/۹۶۸	۱۲	۶	۱۱/۶۶	۷	CC
آلل ها						
۰/۲۳۸	۱/۳۰۳	۶۶	۶۶	۷۱/۶۷	۸۶	T
۰/۲۰۸	۰/۷۶۷	۳۴	۳۴	۲۸/۳۳	۳۴	C

برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده از روش RFLP تعدادی از محصولات با استفاده ازsequencing (شرکت ماکروژن، کره جنوبی) توالی یابی شدند (شکل ۲). نتایج به دست آمده از توالی یابی نتایج مربوط به RFLP را تایید نمود به طوریکه نمونه هایی که توسط آنزیم هضم شده بودند در جایگاه مربوط به پلی مورفیسم C-۲۵۱۸T آلل C را نشان می دهد.

تفاوت های ژنوتیپی و آللی موجود در میان گروه بیمار و کنترل با استفاده از آزمون فیشر و مجذور کاری مورد بررسی قرار گرفت. P کمتر از ۰/۰۵ به صورت معنی دار در نظر گرفته شده است.

نتایج:

برای بررسی پلی مورفیسم C-2518T در زن AMD ۶۰، فرد مبتلا به بیماری AMD و ۵۰ نفر سالم به عنوان گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. طیف سنی افراد مبتلا ۷۴/۴۲ سال بود. از میان بیماران ۲۴ نفر آن ها زن و ۳۶ نفر مرد بودند هیچ گونه ارتباط معنی داری از لحاظ سن و جنس در بیماران مشاهده نگردید. توزیع ژنوتیپی بین گروه کنترل و بیمار بررسی شده و مشاهده گردید که فرکانس TT در گروه بیماران در مقایسه با گروه کنترل بالا می باشد (۵۵ درصد در مقایسه با ۴۴ درصد) ولی این میزان از لحاظ آمار معنی دار نبود ($P=0/۰۷۹$). فرکانس



شکل ۲: نتایج حاصل از توالی یابی زن -۲۵۱۸C در جایگاه CCL2

نوکلوتید C با پیک به رنگ آبی، نوکلوتید T به رنگ قرمز، نوکلوتید G به رنگ مشکی و نوکلوتید A به رنگ سبز مشخص شده است. (الف) سکانس از افراد حامل ژنوتیپ CC (ب) ژنوتیپ TC (هم آلل T و هم آلل C مشاهده میشود) و (ج) ژنوتیپ TT

در جایگاه ۲۵۱۸- باعث افزایش سطح MCP1 ترشح شده از مونوسیت ها می شود (۹). از طرف دیگر در التهاب حادی که در AMD اتفاق می افتاد میزان CCL2 در ناحیه رتینا و RPE افزایش می یابد. آکشای آناند و همکارانش ارتباط پلی مورفیسم rs4586 در این ژن را با خطر ابتلا به بیماری AMD مشاهده کردند (۱۷) در حالیکه دامینیک دسپریت و همکارانش هیچ گونه ارتباطی را در این زمینه مشاهده نکردند (۱۸).

مطالعه حاضر در جمعیت شمال غرب ایران نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری را بین پلی مورفیسم ۲۵۱۸- ژن CCL2 و بیماری تحلیل ماقولای وابسته به سن نشان نداد. این یافته نشان دهنده ای این است که پلی مورفیسم ۲۵۱۸- در ژن CCL2 نقش مستقیمی در استعداد ابتلا به بیماری AMD ندارد که ممکن است به دلیل دخالت تغییرات ژنتیکی دیگر در این ژن و یا نقش ژن های دیگر باشد. البته با مطالعه در جمعیت های با نژاد متفاوت و یا مطالعه در سطح گسترده تر شاید بتوان نتایج متفاوتی را به دست آورد.

نتیجه نهایی:

پلی مورفیسم C-2518T ژن CCL2 ارتباط معنی داری با استعداد ابتلا به بیماری تحلیل ماقولای وابسته به سن ندارد. بنابراین پیشنهاد میشود بررسی های مربوط به نقش این ژن در بیماری تحلیل ماقولای وابسته به سن در سطح گسترده تری انجام شده و همین طور نقش پلی مورفیسم های دیگر و سایر ژن هایی که در ارتباط متقابل با ژن CCL2 هستند بررسی گردد.

سپاسگزاری:

این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مصوب قطب علمی تنواع زیستی دانشگاه تبریز می باشد. بدینویسیله از کلیه بیماران و خانواده های ایشان قدردانی می گردد. ضمناً نتایج این مطالعه با منافع شخصی نویسندها در تعارض نمی باشد.

References

- Ni Dhubghaill SS, Cahill MT, Campbell M, Cassidy L, Humphries MM, Humphries P. The pathophysiology of cigarette smoking and age-related macular degeneration. *Adv Exp Med Biol* 2010; 664: 437-446.
- Donoso LA, Kim D, Frost A, Callahan A, Hageman G. The role of inflammation in the pathogenesis of age-related macular degeneration. *Surv Ophthalmol* 2006;51:137-52.
- Klein R, Knudtson M, Klein B, Wong T, Cotch M, Liu K, et al. Inflammation, complement factor H, and age-related macular degeneration. *Ophthalmology* 2008; 115(10):1742-1749.
- Anderson DH, Mullins RF, Hageman GS, Johnson LV. A role for local inflammation in the formation of drusen in the aging eye. *Am J Ophthalmol* 2002; 134:411-31.

بحث:

تحلیل ماقولای وابسته به سن یکی از علل شایع نابینایی در افراد مسن میباشد که علت اصلی بروز بیماری تاکنون مشخص نشده است. نقش تنوعات ژنتیکی در بیماری AMD به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است اگرچه ارتباط مستقیم بین بروز بیماری و موتاسیون در ژن های مسئول دیستروفی های ماقولا تنها در موارد کمی گزارش شده است (۱۱،۱۲).

اخیرا پلی مورفیسم Y402H در فاکتور H سیستم کمپلمن در ارتباط با بیماری AMD گزارش شده است. به علاوه هاپلوتاپ های مخصوصی در فاکتورهای B/C2 در ارتباط با این بیماری دیده شده است (۱۳).

نقش ژن های پیش التهابی از جمله سایتوکاین ها و کموکاین ها نیز در این بیماری به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. سایتوکاین ها و کموکاین ها پروتئین های محلولی هستند که بسیاری از پروسه های بیولوژیکی را از جمله پاسخ های ایمنولوژیکی و التهابی را تنظیم میکنند از این رو تنظیم نادرست سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی میتواند منجر به بیماری های التهابی شود (۱۴).

از میان ژنهای مربوط به سایتوکاین ها پلی مورفیسم +781 در ژن IL-8 در ارتباط با بیماری AMD گزارش شده است (۱۳). در مطالعه ای که در جمعیت تایوان صورت گرفته است پلی مورفیسم ۱۰۳۱- ژن TNF- α ارتباط معنی داری با ریسک ابتلا به بیماری نشان داده است (۱۵). مطالعه ای که در ارتباط با پلی مورفیسم های 308G/A و 1031T/C در ژن TNF- α در جمعیت شمال شرق ایران انجام شد هیچ گونه همراهی بین این پلی مورفیسم ها و بیماری AMD مشاهده نشد (۱۶).

مطالعات گذشته نشان می دهد که پلی مورفیسم های ژن CCL2 میتوانند میزان این کموکاین را تحت تاثیر قرار دهند با توجه به نتایج مطالعات راوین و همکارانش آل C

5. Penfold PL, Madigan MC, Gillies MC, Provis JM. Immunological and aetiological aspects of macular degeneration. *Prog Retin Eye Res* 2001; 20:385–414.
6. Ernst E, Hammerschmidt DE, Bagge U, Matrai A, Dormandy JA. Leukocytes and the risk of ischemic diseases. *JAMA* 1987; 257:2318–24.
7. Patel N, Adewoyin T, Chong NV. Age-related macular degeneration:a perspective on genetic studies. *Eye* 2008; 22(6): 768–776
8. Raman D, Delmaire T, Richmond A. Chemokines in health and disease. *Exp Cell Res* 2011; 317(5): 575–589.
9. Rovin B, Lu L, Saxena R. A novel polymorphism in the MCP-1 gene regulatory region That influences MCP-1 expression. *Biochem Biophys Res Commun* 1999; 259: 344–348.
10. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. *Nucleic Acids Res* 1988; 16(3):1215
11. Papis K, Zaras M, Krzyzanowska A, Wozniak K, Blasiak J, Szaflik J, et al. Association between vascular endothelial growth factor gene polymorphisms and age-related macular degeneration in a Polish population. *Exp Mol Pathol* 2009; 87 234–238.
12. Churchill AJ, Carter JG, Lovell HC, Ramsden C, Turner SJ, Yeung A, et al. VEGF polymorphisms are associated with neovascular age-related macular degeneration. *Hum Mol Genet* 2006; 15(19) 2955-61.
13. Cascella R, Ragazzo M, Strafella C, Missiroli F, Borgiani P, Angelucci F,etal. Age-Related Macular Degeneration: Insights into Inflammatory Genes. *J Ophthalmol* 2014. doi: 10.1155/2014/582842
14. Tsai YY, Lin J, Wan L, Tsai Y, Lee CC, Tsai CH, et al. Interleukin Gene Polymorphisms in Age-Related Macular Degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2008; 49(2): 693-8
15. Wan L, Lin HJ, Tsai Y. Tumor necrosis factor- α gene polymorphisms in age-related macular degeneration. *Retina* 2010; 30:1595-600.
16. Jabbarpour Bonyadi MH. Bonyadi M, Ahmadieh H, Fotouhi N, Shoeibi N, Saadat S, et al. Tumor necrosis factor gene polymorphism in advanced nonexudative age related macular degeneration in northeastern Iran city of Gonabad. *J Ophthalmic Vis Res.* (in print)
17. Anand A, Sharma NK, Gupta A, Prabhakar S, Sharma SK, Singh R, et al. Single Nucleotide Polymorphisms in MCP-1 and Its Receptor Are Associated with the Risk of Age Related Macular Degeneration. *PLoS One* 2012; 7(11) e49905
18. Despriet DD, Bergen AA, Merriam JE, Zernant J, Barile GR, Smith RT. Comprehensive analysis of the candidate genes CCL2, CCR2, and TLR4 in age-related macular degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* Jan 2008; 49(1): 364–371.

Original Article

Study of C-2518T Polymorphism of CCL2 Gene in Age Related Macular Degeneration Patients from Northwest of Iran

T. Mohammadian, M.Sc. ^{*}; M. Bonyadi, Ph.D. ^{**}; A.R. Javadzadeh, M.D. ^{***}
^{****}
M.H. Jabbarpoor Bonyadi, M.D.

Received: 29.12.2014

Accepted: 11.5.2015

Abstract

Introduction & Objective: Age-related macular degeneration (AMD) is a disease affecting the central regions of the retina and choroid, which can lead to loss of central vision. Etiological research suggests that AMD is a complex disease, caused by the actions and interactions of multiple genes and environmental factors. Numerous studies have focused on the role of chemotactic cytokines, also known as chemokines. Certain chemokines, such as CCL2 appear to be crucial in development of retinal degeneration and choroidal neovascularization. To determine whether variants in the CCL2 gene are associated with age-related macular degeneration we studied C-2518T polymorphism of this gene in AMD patients from Northwest of Iran.

Materials & Methods: In this case-control study, the association of C-2518T polymorphism in the promoter region of CCL2 gene was investigated in 60 patients suffering from AMD and 50 healthy age, sex and ethnicity matched unrelated people as control group. Both of the case and control groups were originated from Northwest of Iran. Genotypes of both groups were determined by polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP).

Results: Statistical analysis shows high frequency of TT genotype and T allele in AMD patients compared to those of control group though the observed difference was not statistically significant.

Conclusion: Despite the existence of small differences between case and control groups statistical analysis of single nucleotide polymorphism (SNPs) in the CCL2 gene did not show a significant association between C-2518T polymorphism and age-related macular degeneration.

(*Sci J Hamadan Univ Med Sci* 2015; 22 (2): 108-113)

Keywords: Genes, CCL2 / Macular Degeneration / Polymorphism

* M.Sc. in Genetics, Center of Excellence for Biodiversity, School of Natural Sciences,
Tabriz University , Tabriz, Iran

** Associate Professor of Molecular Medical Genetics, Center of Excellence for Biodiversity, School of Natural Sciences
Tabriz University , Tabriz, Iran (jabbarpour@tabrizu.ac.ir)

*** Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences & Health Services, Tabriz, Iran.

**** Ophthalmologist, Ophthalmic Research Center
Shaheed Beheshti University of Medical Sciences & Health Services, Tehran, Iran.